



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Medicina

Unidad de Posgrado

Programa de Segunda Especialización en Medicina Humana

**“Factores asociados a corioamnionitis en gestantes con
ruptura prematura de membranas en el Hospital
Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, mayo
2009 – abril 2012”**

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Para optar el Título de Especialista en Ginecología y Obstetricia

AUTOR

Luis Antonio ZÚÑIGA CARPIO

Lima, Perú

2012

RESUMEN

Objetivos: Identificar los factores asociados a corioamnionitis en gestantes con ruptura prematura de membranas en el Hospital Nacional Docente Madre Niño san Bartolomé en el periodo Mayo 2009-Abril 2012.

Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, analítico, retrospectivo y transversal. Se revisaron 218 historias clínicas de pacientes con diagnóstico de ruptura prematura de membranas de las cuales 109 presentaron corioamnionitis (casos) y 109 no presentaron corioamnionitis (controles); en el periodo que correspondió al estudio.

Resultados: la media de la edad de las pacientes fue de 24.9+/-5.75 años. En el grupo de los casos, 65.1% eran convivientes; 83.5% tenían grado de instrucción secundaria; 93.6% eran amas de casa; ninguna tuvo hábitos nocivos; 63.3% eran nulíparas; 98.2% no tenían el antecedente de embarazo gemelar; 46.8% tuvieron infecciones urinarias; 58.7% no tuvieron control prenatal; 83.5% tuvieron parto cesárea.

Conclusiones: Los factores asociados a corioamnionitis en gestantes con ruptura prematura de membranas fueron el no control prenatal, el estado civil de soltería, el tiempo de RPM prolongado, y el aumentado número de tactos vaginales.($P<0.05$)

Palabras clave: ruptura prematura de membranas, corioamnionitis, factores.